

Doxipet[®]

Antibiótico

Uso veterinario.

Comprimidos de uso oral para caninos y felinos.

Las tetraciclinas fueron introducidas en la práctica clínica por su actividad sobre Gram positivos, Gram negativo, bacilos, cocos, Leptospiras, Rickettsias, Chlamydias, Mycoplasmas, Actinomyces, Brucellas. La doxiciclina es una tetraciclina de última generación que tiene una acción bacteriostática tanto sobre organismos intracelulares como extracelulares. Presenta progresos frente a las demás tetraciclinas dado que es altamente lipofílico lo que aumenta su tasa de absorción, que garantiza la mejor penetración a través de la membrana celular y una gran afinidad por los tejidos. Aunque las bacterias desarrollan resistencia a las tetraciclinas clásicas son sensibles a la doxiciclina debido a su mayor capacidad de penetración en la membrana celular y la pared bacteriana. Debido a su forma de eliminación diferente a las otras tetraciclinas, puede usarse en pacientes con insuficiencia renal previa.



INDICACIONES DE USO

Tratamiento de infecciones locales o sistémicas especialmente en: infecciones respiratorias, infecciones genito urinarias y de piel, de oído, así como casos de Leptospirosis Anaplasmosis, anemia infecciosa felina, Rickettsiosis, Mycoplasmosis, Chlamydiosis, Ehrlichiosis canina.

Agentes etiológicos susceptibles: Pasteurella spp., Bordetella spp., Brucella spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Neisseria spp., Campylobacter spp., Salmonella spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus (grupo D), Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp., Actinomyces spp., Leptospira spp., Mycoplasma spp., Ehrlichia canis, Rickettsia rickettsii, Chlamydia spp. y Haemobartonella felis.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene

Doxiciclina HCL..... 100 mg

Excipientes csp 400 mg

DOSIFICACIÓN

Dosificación general recomendada

Caninos y felinos 5 mg/kg de peso cada 12 horas o 10 mg/Kg de peso cada 24 hs durante 7 a 14 días, la duración del tratamiento depende del agente etiológico.

ORIENTATIVO

Caninos:

- Para infecciones causadas por organismos susceptibles 5 mg/Kg cada 12 horas con la comida. Puede suministrarse 10 mg/Kg cada 24 horas.
- Para ehrlichiosis canina 5-10 mg/Kg cada 12-24 horas por 2-3 meses. También se puede indicar 5 mg/kg una vez al día por 7 días en casos agudos y 10 mg/kg una vez al día por 7-21 días en casos crónicos.
- Para la enfermedad de Lyme 10 mg/Kg cada 24 horas por 21-28 días.

Felinos:

- Para infecciones causadas por organismos susceptibles 5 mg/kg cada 12 horas suministrada con la comida.
- Para la ehrlichiosis felina 10 mg/Kg dos veces al día.

Dosis orientativas según el agente etiológico causante de la infección y según criterio del médico veterinario actuante. 1/4 comprimido /5 kg de peso.

CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

No utilizar en animales hipersensibles. La administración en hembras preñadas y cachorros jóvenes puede ocasionar coloración de los dientes por la fijación del antibiótico en dientes y huesos. No administrar en pacientes menores de 5 Kg de peso. Administrar el producto preferiblemente en animales con el estómago lleno.

Administrar vía oral acompañado de las comidas. El comprimido debe administrarse con una pequeña cantidad de líquido, especialmente en gatos, para asegurarse de que llegue al estómago. La doxiciclina puede causar llagas en la garganta y el esófago si se atasca antes de llegar al estómago. No suministrar a hembras preñadas. No suministrar en animales menores de 30 días. Este producto puede producir resistencia a los antimicrobianos.

ALMACENAMIENTO

No almacenar a temperaturas superiores de 30°C. Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. Mantener alejado de los niños y animales domésticos. Eliminar el envase en el centro de acopio más cercano.

UNIMEDICAL Div. Veterinaria

Industria Uruguaya - Unimedical del Uruguay Ltda.
Paysandú 986 - Tel.:(+598) 2900 0090 - C.P.: 11100
Montevideo, Uruguay / Establecimiento Elaborador N° 81
Dir.Téc.Dra. Mercedes Etcheverry