

Predniderm[®] CREMA

Crema curativa tópica

Uso veterinario.
Caninos y felinos.

INDICACIONES

Indicado para el tratamiento tópico de infecciones inflamatorias o pruriginosas de piel y oídos en perros y gatos causadas por microorganismos susceptibles, tales como: *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Proteus* spp.

Especialmente útil en dermatitis bacterianas superficiales, piodermas localizadas, heridas infectadas superficiales y dermatitis húmeda aguda (según criterio profesional).



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

En caso de lesiones en la piel, se debe separar bien el pelo del animal y aplicar el producto directamente sobre la zona afectada. En animales con mucho pelo se recomienda rasurar el área para lograr una mejor absorción del producto. Colocar una cantidad suficiente para cubrir completamente la lesión. En casos de otitis, realizar primero una limpieza del oído y luego introducir una pequeña cantidad de crema con ayuda de un hisopo. A continuación, masajear suavemente la base de la oreja para asegurar una correcta distribución. La frecuencia de aplicación recomendada es de una a dos veces por día según el criterio del Médico Veterinario. La duración del tratamiento es de cinco a siete días consecutivos y, si fuera necesario, puede extenderse hasta un máximo de diez días bajo supervisión profesional. No se debe suspender el tratamiento antes del tiempo indicado, aunque los signos clínicos hayan mejorado.

FÓRMULA

Cada 100 gr contiene

Cefalexina monohidrato (Cephalexin monohydrate).....	1 g
Neomicina Sulfato (Neomicine Sulfate)	1.5 g
Prednisolona (Prednisolone)	0.25 g
Excipientes c.s.p (Excipients qs).....	100 g

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Cefalexina: antibiótico -lactámico bactericida de amplio espectro.

Neomicina: aminoglucósido bactericida con acción frente a Gram negativos y algunos Gram positivos.

Prednisolona: corticoide con acción antiinflamatoria y antipruriginosa que contribuye a reducir eritema, edema y prurito asociados a procesos inflamatorios cutáneos.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida a cefalosporinas, aminoglucósidos o corticoides. No usar en infecciones micóticas o virales primarias que no hayan sido tratadas previamente. No aplicar sobre heridas profundas, abscesos cerrados ni en quemaduras extensas. No utilizar en la zona auricular cuando exista perforación timpánica. Evitar el uso prolongado sin supervisión del Médico Veterinario.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Producto de uso tópico. Evitar el contacto con ojos y mucosas. Impedir que el animal lama la zona tratada; utilizar collar isabelino u otro método de protección si fuera necesario. El uso prolongado o en superficies extensas puede favorecer la absorción sistémica de corticoides y antibióticos. El uso prolongado de corticoides tópicos puede retardar la cicatrización. En tratamientos prolongados puede producirse sensibilización cutánea o infecciones secundarias. No prolongar el tratamiento más allá del tiempo indicado sin supervisión del Médico Veterinario. Si no se observa mejoría clínica en pocos días o los signos empeoran, suspender el uso y reevaluar el diagnóstico. El uso repetido puede favorecer el desarrollo de microorganismos resistentes. Usar con precaución en gatos debido a su mayor susceptibilidad a efectos sistémicos de corticoides cuando existe absorción significativa. Utilizar con precaución en animales gestantes, en lactación, muy jóvenes o con enfermedades sistémicas, únicamente bajo criterio profesional. Lavarse las manos después de la aplicación.

EFFECTOS ADVERSOS

En general el producto es bien tolerado cuando se utiliza según las indicaciones. En forma ocasional pueden presentarse reacciones locales en el sitio de aplicación como enrojecimiento, irritación, prurito, ardor o dolor leve. En animales sensibles pueden producirse reacciones de hipersensibilidad a los antibióticos o a los corticoides, que se manifiestan como inflamación, erupción cutánea o empeoramiento de la lesión; en estos casos se debe suspender el tratamiento. El uso prolongado puede favorecer adelgazamiento de la piel, retraso en la cicatrización y aparición de infecciones secundarias. Cuando se aplica en superficies extensas, en tratamientos prolongados o bajo condiciones que aumenten la absorción, pueden presentarse efectos sistémicos de corticoides, especialmente en gatos y animales jóvenes. En uso ótico, raramente pueden observarse trastornos auditivos si se aplica con membrana timpánica no íntegra.

Ante la aparición de cualquier efecto no esperado, discontinuar la aplicación y consultar al Médico Veterinario

ALMACENAMIENTO

Mantener en su envase original, bien cerrado. Almacenar en un lugar seco, fresco y protegido de la luz solar directa. No almacenar a temperaturas superiores a 30°C. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. Eliminar en el centro de acopio mas cercano. Este producto puede producir resistencia a los antimicrobianos. Una vez abierto y transcurrido 6 meses descartar. Venta bajo receta médica.

UNIMEDICAL Div. Veterinaria

Industria Uruguaya - Unimedical del Uruguay Ltda.
Paysandú 986 - Tel.:(+598) 2900 0090 - C.P.: 11100
Montevideo, Uruguay / Establecimiento Elaborador N° 81
Dir.Téc.Dra. Mercedes Etcheverry