

Prednisolona[®] 20

Antiinflamatorio Antipruriginoso / Antialérgico

Uso veterinario.
Comprimidos de uso oral para caninos y felinos.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Prednisolona 20 mg
Excipientes c.s.p 250 mg

ACCIÓN

La prednisolona es un corticoesteroide sintético de acción intermedia.

INDICACIONES

Uso en caninos y felinos como antiinflamatorio, antipruriginoso y antialérgico. Se recomienda en lesiones inflamatorias y alérgicas de la piel. Como terapia de reemplazo, como tratamiento de procesos inflamatorios y alérgicos, al suprimir los procesos inflamatorios. Controla los procesos autoinmunes (pénfigo, vulgar, pénfigo vegetante, pénfigo foliáceo y el pénfigo eritematoso) dermatitis alérgicas, por contacto, seborreicas.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Se aconseja administrar los comprimidos en el perro, en la mañana, entre las 7 y 10 hs. En el gato, en la noche, entre 22 y 24 hs para coincidir con la curva hormonal normal.

Vía oral caninos:

Terapia de reemplazo: 0.25 mg/kg.
Procesos inflamatorios y alergias cutáneas: 0.5 - 1 mg/kg/día.
Enfermedades inmunes y ciertas neoplasias: 2 -4 mg/kg/día.

Vía oral felinos:

Procesos inflamatorios: Prednisolona 1 - 2 mg / kg por día
Como inmunosupresor: 2-4 mg/Kg /día en dosis divididas.
Tratamiento adyuvante del asma felino: 1-2 mg/Kg
Procesos inflamatorios adyuvante de la alergia por pulgas: 1-2 mg/Kg cada 12 horas.
Para la dermatosis miliar idiopática felina: 1-2 mg /Kg oral cada 12 horas

En tratamientos prolongados para caninos:

- 1) Realizar la inducción de 5 a 7 días a razón de 0.5 mg/Kg /día
- 2) Continuar con una dosis doble de 1 a 2 mg/kg/día cada 48 hs suministrándola a la mañana en el perro y a la noche en el gato
- 3) Reducir la dosis al 50% en intervalos semanales.
- 4) Suspender el tratamiento en forma gradual.



En tratamientos prolongados para felinos:

- 1) Realizar la inducción de 5 a 7 días
- 2) Como inmunosupresor disminuir a un esquema en dosis baja día por medio.
- 3) Procesos inflamatorios adyuvante de la alergia por pulgas durante 5 días luego disminuir gradualmente la dosis hasta llegar a un esquema de días alternos por lo general 1-2 mg/Kg por día por medio al atardecer.
- 4) Para la dermatosis miliar idiopática felina horas durante 5-7 días luego disminuir gradualmente la dosis hasta llegar a un esquema de días alternos por lo general 1-2 mg/Kg por día por medio al atardecer.
- 5) Suspender el tratamiento en forma gradual.

CONTRAINDICACIONES

No usar en caso de sarna demodéctica, artritis crónica, insuficiencia hepática y renal, ulcera duodenal, en la pancreatitis aguda enfermedades micóticas y glaucoma. En infecciones bacterianas, virales o fúngicas se deben usar con mucha cautela ya que pueden originar diseminación y potenciación de la infección aunque se administre junto con antibacterianos o antifúngicos

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 10 comprimidos.

ADVERTENCIAS

Dosis exageradas pueden provocar hipofunción adrenal.

ALMACENAMIENTO

No almacenar a temperaturas superiores de 30°C. Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. Mantener fuera del alcance de niños, y animales domésticos. Eliminar el envase en el centro de acopio más cercano.

UNIMEDICAL Div. Veterinaria

Industria Uruguay - Unimedical del Uruguay Ltda.
Paysandú 986 - Tel.:(+598) 2900 0090 - C.P.: 11100
Montevideo, Uruguay / Establecimiento Elaborador N° 81
Dir.Téc.Dra. Mercedes Etcheverry